Luglienga Vass8R01s136-140

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp650

English 136. 140

Luglienga 8 R 1 1.136-140







ANNEE 1988

NOM Luglienca le EMPLACEMENT & RI 1 136. 1400

A Language Committee of the Committee of										A Comprehensive		
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 {	34444	14 1.4	54 54 54	0 0 1	1	31.5	36	6_6	8.8	12.8	16.8	21-9
				06,15.3:	Port : ^	w'enge a foriebe	Vig 3,6 +3	ueur	I moy	eune +3		+6

ANNEE 1989

NOM Luglienga EMPLACEMENT 8 R.1.86.140

-	m in the second											
Souch	uche yeux début mi/déb			Ferti- lité		Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité	
1 2 3 4 }	4	23 3	273. 273. 273.	1	1,2	26	5,6 +9	10.6				
Pourriture: Mill.: Port: Cauche Vigueur: 3 Dl. 27.3.89 +9 grapper Seches le lo. 7.89.												

duntuduntuduntuduntud

		199 Lugh	o ienga	ai .	EMPLACE	MENT	8 R 1	11	36.1	40		
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
5	23-)	8.5 & 19.3	90 ((110)				21.5				18,9,90
Pot	Pourriture: 0 Mill.: Port: Vigueur:											

NOM Luglieuga EMPLACEMENT 8 kg / s 136. 160												
Souche	Nbré yeux	Débou	rrement mi/deh	More	Perti-	Flor	raison	fin	Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	/ Could	s.S.			Pour : Baie :	TG - (disc-specific B-(specific B-(specifi	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	l; - P [-ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus inc		: L - M- C

N° d'ordre : Englienga : Septembre : 8 R 1 s. 136-140 (5.137)

(A) BOURGEONNEMENT

nhantaahaataahaataah

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

<u>luntumbunt</u>arbatash

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 206 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 283 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 221 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 260 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 266 - sans villosité laineuse 287.

Total ment - sillon - partiellement.

Calvo 87

Mod'ordre :

Désignation : Emplacement : Englienga 8 R 1 s - 136-140 (s. 137)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines cu analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241 sans villosité pubescente 268 - sans villosité laineuse 289) Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. Noeuds

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263 Vrille

subcontinues - intermittentes.

tres courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

luntum mutu

Inglienga 8 R 1 s - 136 - 140 (5.2)

nliminaliminaliminaliminaliminal

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 177 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

- Calvo 88

N° d'ordre: Luglienga
Désignation: 8 R 1s-136-140 A.3
Emplacement:

GRAPPE

dantadantadantadantad

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (0) (dimensions 42 x 14).

Lâche (1) - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :46 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 62)- pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 voïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 1(29). A pinceau : court 130 - moyen 161 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34. A peau fine 185) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec papins - apyrène.

Calvo88

Luglienga 8 RS 136. 140 (0-3) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (3) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

dinatanlaataalaataalaataal

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoso

N° d'ordre : Désignation : Luglienca ll Emplacement : 8 R / s 136 140

Juntum mutru

```
: 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                  : (7) - (8) - 9
L_1/L_2
                                  : (10) - (11)
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                               : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - 22 - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
                                  : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : 40 - 41
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                          : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
                          : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                               : (63 - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90

dinataalaataalaataalaataal